

中国科学技术大学 2024 秋季学期
《概率论》期末试题 2024.12.25

姓名: 学号: 分数:

1. (20分) (i) 任给二阶矩存在的随机变量 X , 当 a 取何值时 $\mathbb{E}[(X - a)^2]$ 最小?

(ii) 对连续型随机向量 (X, Y) , Y 的二阶矩存在, 令

$$H = \{g(X) : g \text{ 为 Borel 可测函数, } g(X) \text{ 二阶矩存在}\}.$$

当 $h(X) \in H$ 时何时 $\mathbb{E}[(Y - h(X))^2]$ 最小?

2. (10分) 随机矩阵指矩阵值随机变量, 一个典型例子是 $p \times n$ 高斯矩阵 $X = (X_{ij})$, 这里 pn 个矩阵元 $\{X_{ij}\}$ 相互独立且均服从标准正态分布 $N(0, 1)$, 记

$$m_k = \mathbb{E} [\text{Tr}(XX^t)^k],$$

这里用到矩阵转置和求迹运算. 求 m_2 的值.

3. (10分) 若 $X_n \xrightarrow{D} X$, $X_n \xrightarrow{D} Y$, 证明 X 和 Y 同分布.

4. (15分) X_1, \dots, X_n 为独立同分布连续型随机变量列, 定义 B_k 为事件 $\{X_k = \max\{X_1, \dots, X_k\}\}$ 的示性函数, 记

$$R_n = \sum_{k=1}^n B_k.$$

(i) 证明 B_k 服从参数为 $1/k$ 的伯努利两点分布 (注: 亦可证明他们相互独立, 下面可直接利用此独立性结论).

(ii) 证明

$$\frac{1}{\sqrt{\log n}} \sum_{k=1}^n (B_k - \frac{1}{k})$$

依分布收敛到标准正态分布.

(iii) 验证 $|\mathbb{E}(R_n) - \log n| \leq 1$, 从而证明

$$\frac{1}{\sqrt{\log n}} (R_n - \log n)$$

依分布收敛到标准正态分布.

5. (15分) 法国数学家 Talagrand 因“对概率论和泛函分析的开创性贡献, 以及在数学物理和统计学中的杰出应用”荣获 2024 年度“阿贝尔奖”, 如何理解高维现象的几何特性是贯穿其研究工作的一条主线.“维数诅咒”与“维数祝福”, 高维空间会出现与直观看似相矛盾的现象和概念. 且看一例, “高维立方体几乎是球体的边界”这一奇特现象.

记

$$A_{n,\epsilon} = \left\{ (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n : (1 - \epsilon)\sqrt{n/3} < \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2} < (1 + \epsilon)\sqrt{n/3} \right\},$$

并用 $|\cdot|$ 表示体积, 试用概率方法证明

$$\forall \epsilon \in (0, 1), \quad \lim_{n \rightarrow \infty} |A_{n,\epsilon} \cap (-1, 1)^n| / 2^n = 1.$$



扫描全能王 创建

6. (15分) 试证明正态分布的如下刻画:

$X \sim N(0, 1)$ 当且仅当 g 和其导数 g' 均为有界连续函数时总有 $\mathbb{E}[Xg(X)] = \mathbb{E}[g'(X)]$.

提示: 对标准正态分布 Z 和有界连续函数 h , 构造一个新的函数

$$g_0(x) = e^{\frac{1}{2}x^2} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{1}{2}y^2} (h(y) - \mathbb{E}[h(Z)]) dy.$$

7. (15分) 记平面上整数格子点 $\Lambda_L := [1, L]^2 \cap \mathbb{Z}^2$, 对 $x = (x_1, x_2) \in \Lambda_L$ 定义 $|x| = |x_1| + |x_2|$, 用 $x \sim y$ 表示 x 与 y 在 Λ_L 中相邻 (即 $|x - y| = 1$). 设 $\{\sigma_x\}_{x \in \Lambda_L}$ 为独立同分布随机变量列, $\mathbb{P}(\sigma_x = 1) = \mathbb{P}(\sigma_x = -1) = 1/2$, 试证明当 $L \rightarrow \infty$ 时

(i)

$$\frac{1}{L^2} \sum_{x \sim y, x, y \in \Lambda_L} \sigma_x \sigma_y \xrightarrow{\text{a.s.}} 0;$$

(ii) 任给 $\delta > 5/4$ 时

$$\frac{1}{L^\delta} \sum_{x \sim y, x, y \in \Lambda_L} \sigma_x \sigma_y \xrightarrow{\text{a.s.}} 0.$$



扫描全能王 创建