

# 2024 春概率论进阶试题回忆

日期: 2024 年 6 月 30 日

1. 一大段无关的阅读材料.

- (a) 举一个概率论和其他方向 (如代数, 分析, 几何, 信息, 物理等) 有关联的例子.
- (b) 写出一个随机变量, 其矩母函数只有纯虚数的零点.

2. 随机变量  $X$  有分布函数

$$\rho_{sc} = \sqrt{4 - x^2}.$$

计算其各阶矩并证明其确定该随机变量.

3. 计算  $n$  重正态分布  $N(\vec{\mu}, \Sigma)$  的熵.

4. 设  $\vec{\sigma} \in 2^N, N \in \mathbb{Z}, d, \beta, h > 0$ . 考虑 Hamilton 量:

$$H(\vec{\sigma}) = -\frac{d}{N} \sum_{i,j=1}^N \sigma_i \sigma_j - h \sum_{i=1}^N \sigma_i,$$

与 Curie-Weiss 模型:

$$\mu_{N,\beta,h} = \frac{1}{Z_{N,\beta,h}} e^{-\beta H(\sigma)},$$

其中  $Z_{N,\beta,h}$  是配分函数. 证明:

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{N} \log(Z_{N,\beta,h}) = \max_{m \in [-1,1]} [\beta hm + \beta dm^2 + S(m)],$$

其中  $S(m)$  是熵:

$$S(m) = -\frac{1-m}{2} \log\left(\frac{1-m}{2}\right) - \frac{1+m}{2} \log\left(\frac{1+m}{2}\right).$$

5. 设  $\{X_1, \dots, X_n, Y_1, \dots, Y_n\}$  是一列独立的随机变量, 其满足

$$\mathbb{E}[X_i] = \mathbb{E}[Y_i], \mathbb{E}[X_i^2] = \mathbb{E}[Y_i^2].$$

设  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  是三阶可微函数,  $U = (X_1, \dots, X_n), V = (Y_1, \dots, Y_n)$ . 证明: 对任意可微函数  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  和  $K > 0$ , 都有

$$\begin{aligned} l|\mathbb{E}[g(f(U))] - \mathbb{E}[g(f(V))]| &\leq C_1(g)\lambda_2(f) \sum_{i=1}^n (\mathbb{E}[X_i^2 I_{|X_i|>K}] + \mathbb{E}[Y_i^2 I_{|Y_i|>K}]) \\ &\quad + C_2(g)\lambda_3(f) \sum_{i=1}^n (\mathbb{E}[|X_i|^3 I_{|X_i|\leq K}] + \mathbb{E}[|Y_i|^3 I_{|Y_i|\leq K}]). \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned} C_1(g) &= \|g'\|_\infty + \|g''\|_\infty, \\ C_2(g) &= \frac{1}{6} \|g'\|_\infty + \frac{1}{2} \|g''\|_\infty + \frac{1}{6} \|g'''\|_\infty \\ \lambda_r(f) &= \sup\{|\partial_i^p f|^{\frac{r}{p}} : 1 \leq i \leq n, 1 \leq p \leq r\}, \end{aligned}$$

为常数. 提示: 令

$$Z_i = (X_1, \dots, X_i, Y_{i+1}, \dots, Y_n), W_i = (X_1, \dots, X_{i-1}, 0, Y_{i+1}, \dots, Y_n),$$

定义  $h(Z_i) = g(f(Z_i))$ , 将  $h$  在  $W_i$  处对  $X_i \vec{e}_i$  展开.

6. 设  $H_N = (h_{ij})$  为  $N \times N$  的矩阵,  $\{h_{ij} : 1 \leq i \leq j \leq N\}$  为独立且同分布于随机变量  $Y$  的随机变量. 其中,  $Y$  的奇阶矩为 0, 偶阶矩有界,  $\mathbb{E}[Y^2] = 1$ . 定义

$$X_{k,N} = \frac{1}{N} \text{Tr}\left[\left(\frac{H_N}{\sqrt{N}}\right)^k\right],$$

$$\gamma_k = \lim_{N \rightarrow +\infty} \mathbb{E}[X_{k,N}].$$

- (a) 写出  $\gamma_k$ , 无需证明.
- (b) 证明:  $X_{k,N}$  依概率收敛到  $\gamma_k$ .
- (c) 证明:  $X_{k,N}$  几乎处处收敛到  $\gamma_k$ .